

Dépistage du cancer colorectal



Le cancer colorectal est le 3^e cancer le plus fréquent au Canada.¹

Un homme sur 14 et une femme sur 18 recevront un diagnostic de cancer colorectal au cours de leur vie.



Grâce au dépistage et à une détection précoce, le cancer colorectal peut être évité et facile à traiter.

1. Gouvernement du Canada. Page, Cancer colorectal au Canada. Disponible à : www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/cancer-colorectal.html. Consulté le 2021-07-02.

Signes avant-coureurs

sang sur ou dans les selles, de couleur rouge vif ou très foncée



changements inattendus dans les habitudes d'évacuation intestinale comme la diarrhée ou la constipation

douleur abdominale constante

sensation que l'intestin ne se vide pas complètement

perte de poids imprévue




fatigue constante

Facteurs de risque

50 ans ou plus



alimentation riche en viandes transformées ou en viande rouge



antécédents familiaux de cancer colorectal ou de polypes, de cancer de l'utérus ou de cancer de l'ovaire



tabagisme



inactivité physique

consommation d'alcool



surpoids ou obésité



maladie inflammatoire de l'intestin (notamment la maladie de Crohn du côlon et la colite ulcéreuse)

Lignes directrices pour le dépistage

Toutes les personnes âgées de 50 ans et plus présentent un risque moyen de cancer colorectal, même en l'absence de symptômes. Votre prestataire de soins de santé vous recommandera un test de dépistage en fonction de vos antécédents médicaux et de votre risque de cancer colorectal. Les tests disponibles varient selon la province et comprennent les suivants :

- test immunochimique fécal (TIF)
- test de recherche de sang occulte dans les selles (RSOS)
- sigmoïdoscopie par tube souple
- coloscopie
- Colographie TDM



Contactez votre équipe soignante. **Faites-vous examiner.**

Pour en savoir davantage, consultez le www.badgut.org/cancer-colorectal.